

BIFENTRIN 25
SIGMA

COMPOSICIÓN:

- **Principio activo:** Bifentrin 25%
- **Forma de actuar:** Contacto e ingestión
- **Formulación:** Concentrado emulsionable
- **Banda toxicológica:** II amarillo

DESCRIPCION GENERAL

BIFENTRIN 25 SIGMA es un insecticida que controla insectos chupadores y masticadores en distintos cultivos. También posee acción acaricida.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plagas	Dosis	TC	Momento de aplicación
Duraznero	Pulgón rojo (Myzus persicae)	4 cm ³ /hl	7	a) Contra la hembra fundadora, en aplicaciones tempranas. Pulverizar en coincidencia con hinchazón de las yemas (se recomienda mojar muy bien, ya que los huevos de los cuales nace la hembra fundadora están ubicados en las yemas) b) Contra colonias establecidas. En primavera al observarse los primeros ataques y preferiblemente antes del enrrollamiento de las hojas.
	Pulgón verde del duraznero			
Manzano	Acaro tejedor (Tetranychus urticae)	8-12 cm ³ /hl	15	Cuando se observen los primeros ataques con una población media de 4-5 ácaros por hoja. En caso de una infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo del nivel de daño económico. Esto por lo general, permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	Arañuela roja europea (Panonychus ulmi)			
	Bicho canasto (Oulethia platanis)	8 cm ³ /hl		Quando se observen las primeras larvas y no haya superado el tercer estadio.
	Chicharritas (cercopidos)			Quando se observen los primeros ataques o síntomas en las hojas. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de cydia siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y la chicharrita son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones por debajo del nivel de daño económico. Esto por lo general, permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	Gusano de la pera y la manzana (Cydia pomonella)			Aplicación foliar siguiendo las indicaciones de los servicios de alarma o según vuelo de adultos caídos en trampas de feromonas, según indicaciones de sus fabricantes
	Psilido del peral (Cacopsyla pyricola)	8-12 cm ³ /hl		A la aparición de mosquitas o a la primera gota de melaza. Aplicar usando gran volumen y buena presión.
	Pulgón verde del duraznero	28 cm ³ /		Emplear no menos de 750 litros de líquido total por hectárea para asegurar buena distribución

Papa	Pulgón rojo (Myzus persicae)	20 cm ³ /hl	7	Emplear no menos de 750 litros de líquido total por hectárea para asegurar buena distribución, cobertura y presión.
Peral	Acaro tejedor (Tetranychus urticae)	8-12 cm ³ /hl	15	Cuando se observen los primeros ataques con una población media de 4-5 ácaros por hoja. En caso de una infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo del nivel de daño económico. Esto por lo general, permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	Arañuela roja europea (Panonychus ulmi)			
	Bicho canasto (Oulethia platanis)	8 cm ³ /hl		Quando se observen las primeras larvas y no haya superado el tercer estadio.
	Chicharritas (cercopidos)			Quando se observen los primeros ataques o síntomas en las hojas. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de cydia siguiendo un programa integral de curas, las arañas y la chicharrita son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones por debajo del nivel de daño económico. Esto por lo general, permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	Gusano de la pera y la manzana (Cydia pomonella)			Aplicación foliar siguiendo las indicaciones de los servicios de alarma o según vuelo de adultos caídos en trampas de feromonas, según indicaciones de sus fabricantes
Psilido del peral (Cacopsyla pyricola)	8-12 cm ³ /hl	A la aparición de mosquitas o a la primera gota de melaza. Aplicar usando gran volumen y buena presión.		
Poroto	Chicharritas (cercopidos)	24 cm ³ /ha	30	Quando se observe la aparición de la plaga.
	Mosca blanca (Bemisia tabaci)			
Soja	Chinche de la alfalfa (Piezodorus guildinii)	64-72 cm ³ /ha	30	Quando se observan dos chinches por metro lineal de surco.
	Chinche verde (Nezara viridula)			
	Oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatilis)	10-14 cm ³ /ha		Dosificar de acuerdo con el desarrollo del cultivo y grado de infestación. Antes de la floración con 15 isocas /m de surco y más de 20% de defoliación. Desde la floración cuando haya 10 orugas/m lineal de surco y más de 10% de daño al follaje.
	Trips del poroto (Caliothrips phaseoli)	62 cm ³ /ha		Aplicar para reducir la población en R3 y R5 (mayor influencia sobre el rendimiento) cuando aparezcan 10 trips adultos por foliolo en la parte media de la planta. Repetir en caso de reinfestaciones.

CONSIDERACIONES

RECOMENDACIONES DE USO

BIFENTRIN 25 SIGMA es compatible con los insecticidas de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina. A la dosis y momentos de aplicación indicados, este producto no presenta efectos fitotóxicos para los cultivos recomendados.

PRESENTACION

BIFENTRIN 25 SIGMA se comercializa en bidones de 1 lts (12 x 1)