

FIPRONIL
SIGMA

COMPOSICIÓN:

fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3 carbonitrilo	20 g
inertes y coadyuvantesc.s.p.	100 cm

- **Formulación:** suspensión concentrada
- **Banda toxicológica:** amarilla

DESCRIPCION GENERAL

Insecticida de la familia de los Fenilpirazoles que actúa por contacto e ingestión, tiene efecto sobre el sistema nervioso central interfiriendo en la transmisión GABA (ácido gama amino butírico) sobre los canales del ion cloro. Tiene poder residual, tanto en el follaje tratado como en aplicaciones al suelo. Por tener un modo de acción distinto a todas las familias de insecticidas, este producto es ideal para rotaciones para el objeto de prevenir posibles resistencias.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de aplicación
Girasol Maíz	Hormigas podadoras (<i>Acromyrmex</i> spp.)	15 – 20 cm ³ /ha	La dosis menor en mezcla con herbicida pre emergente. La mayor como curativo en post emergencia.
Pasturas	Tucuras (<i>Dichroplus</i> spp.) Tucuras (<i>Tropinotus laevipes</i>)	20 cm ³ /ha	Cuando se observen los primeros adultos o 10 mosquitas o saltonas por metro lineal.
Soja	Bicho bolita (<i>Armadillidium vulgare</i>)	20 cm ³ /40 kg de semilla partida de soja /ha	Aplicar cuando se detecten los primeros daños.
	Grillo negro subterráneo (<i>Anurogryllus muticus</i>)	25 cm ³ /ha	Aplicar cuando se detecten los primeros cambios.
	Hormigas podadoras (<i>Acromyrmex</i> spp.)	15 – 20 cm ³ /ha	La dosis menor en mezcla con herbicida pre emergente. La mayor como curativo en post emergencia.
	Picudo de la soja (<i>Sternechus pinguis</i>)	25 cm ³ /ha	Aplicar cuando se observen los primeros adultos. Repetir en caso de reinfestaciones.
Sorgo	Siete de oro (<i>Astylus atromaculatus</i>)	20 cm ³ /ha	Cuando el tercio medio de la panoja tenga los estambres expuestos.

PRESENTACIÓN

- 12 botellas de 1 lts.